





care PLUS®

TICK-OUT TICKS-2-GO



FR - MODE D'EMPLOI

Le Tick-out Ticks-2-Go a deux ouvertures, selon la taille des tiques.

1. Saisir l'instrument entre le pouce et le majeur, puis positionner-le avec précaution autour la tique.
 2. Tirer prudemment pour extraire la tique à la verticale.
- Désinfecter la plaie et noter la date de la morsure.

QU'EST-CE QU'UNE TIQUE ?

Une tique est un arachnide acarien parasite qui se maintient en vie en se nourrissant du sang des animaux et des humains.

POURQUOI LES TIQUES SONT-ELLES DANGEREUSES ?

Les tiques peuvent transmettre des virus, bactéries et parasites par leur morsure. La bactérie la plus connue et la plus dangereuse qu'une tique peut transmettre est *Borrelia burgdorferi*, qui cause la maladie de Lyme. Celle-ci peut entraîner toutes sortes de problèmes de santé. L'apparition d'un érythème autour de la plaie peut être l'un des premiers symptômes de la maladie de Lyme.

EXTRACTION D'UNE TIQUE

Veiller à retirer la tique dans les 8 heures pour minimiser le risque d'infection.

CONSEIL !

Si vous vivez dans une zone à risque, vérifiez régulièrement que vous, votre conjoint et vos enfants n'avez pas été mordus.

AVERTISSEMENTS

Ne pas anesthésier la tique à l'alcool ou avec un autre produit. Ne pas la brûler, p.ex. avec une cigarette. Lorsqu'une tique est anesthésiée ou brûlée, elle entre en état de choc et, en réaction, régurgite ses toxiques via sa salive.

Pour plus d'info visitez www.stoppelatique.be



Distributed by:
Tropenzorg B.V.,
De Huchtstraat 14
NL-1327 EE Almere
© +31 (0)36 -5334711
www.careplus.eu